


# DERMATITIS ATÓPICA

## ¿A quién afecta?

**10%**



**15%**



De la población general



**80%**

Se manifiesta antes del año de edad



**95%**

en los primeros 5 años.



**10%**


**14%**

en los primeros 14 años.


# DERMATITIS ATÓPICA

## ALTERACIONES PSICOSOCIALES


- Sentimientos de vergüenza y baja autoestima.
- Problemas con relaciones personales y sociales.
- Problemas con el trabajo



Frustrados  
por la  
enfermedad



Avergonzados  
por su  
apariencia




Enojados  
por su  
apariencia



# DERMATITIS ATÓPICA

¿Cómo se mide la gravedad de la **Dermatitis Atópica** y su distribución?




Medición a través del SCORAD  
- EASI - POEM - CUESTIONARIOS  
DE CALIDAD DE VIDA

**70% LEVE**

**20% MODERADO**

**2-5% GRAVE**


- Estigmatización
- Rechazo Social
- Limitaciones sociales
- Discriminación
- Evitación social
- Estrés



# DERMATITIS ATÓPICA

## Síntomas principales

El prurito es la carga más común y persistente en los pacientes con DA de **moderada a grave**.



LA DA moderada a grave afecta la **vida sexual** de las personas

Disminuyó su deseo sexual al menos ocasionalmente. **58%**

**55%** La apariencia de su piel afectó su vida sexual.

El tratamiento de la enfermedad afectó su vida sexual. **47%**

## SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO, EMOCIONALES, PSICOLÓGICOS

Transtorno por Déficit de Atención e Hiperactividad



Ansiedad  
Depresión

## ASPECTOS AFECTADOS EN DA EN NIÑOS

- Alteraciones en el sueño
- Afecta la relación de sus padres ya que pueden llegar a sentir culpa.
- Alergias alimentarias.
- Ambiente en el hogar.
- Costos.
- Afecta la relación con sus hermanos.



## LIMITACIONES

- Costos de los estudios de laboratorio.
- Costo de los medicamentos.
- Efectos secundarios de los medicamentos.
- Imposibilidad de acudir a las citas médicas.
- Falta de respuesta al tratamiento.

# DERMATITIS ATÓPICA



## ¿CÓMO MEJORAR LA ENFERMEDAD?

- Manejo del estrés y comportamiento.
- Valorar entorno y núcleo familiar.
- Estar en un clima templado con ropa de algodón.
- Dieta ante hipersensibilidad de alimentos.
- Baños cortos, no jabones.
- Sustitutos de jabón y aceites hidromisibles.
- Antihistamínicos, ansiolíticos o sedantes.